

On voit assez fréquemment des femmes accoucher de deux ^{Jumeaux} ~~enfants~~; quelquefois il y en a trois; et même on a vu naître d'un même accouchement jusqu'à cinq enfants. mais cette polygénésie est fort rare dans l'espèce humaine; et on estime, probablement d'après des calculs, que sur 6500 accouchemens à peine s'en trouve-t-il un d'enfants, sur 20000 un de quatre, et un de cinq sur un million. Le nombre de cinq parait être le terme de la gestation d'une femme, car il n'y a point d'exemple bien avéré qu'il y ait eu des accouchemens ^{d'un plus grand nombre} ~~de plus de cinq~~, et je serois fâché que tous les récits qu'on nous fait ^{en fait} ~~de ces accouchemens~~ cette observation même parait avoir été faite anciennement; car Plutarque dit que les cinq flambeaux, qu'on portoit devant les nouveaux mariés, signifioient que la femme ne pouvoit en plus, porter que cinq enfans à la fois.

Les Physiologistes n'ont pu encore décider si plusieurs ^{fœtus} ~~enfants~~ qui se trouvent en même tems dans la matrice, ont été conçus à la fois, ou si dans les premiers mois de la grossesse, une coagulation subséquente peut féconder de nouveau, c'est-à-dire, s'il se peut faire superfétation; la raison semble prouver qu'elle est impossible; aussi l'opinion la plus commune est qu'elle ne peut avoir lieu; cependant on allégué des raisons, et on cite un grand nombre d'exemples, qui semblent s'opposer en faveur de cette possibilité.

Les partisans de la superfétation disent premièrement, que la matrice ne se ferme pas exactement dans toutes les femmes qui ont conçu; et que si son orifice reste blanc après une conception, la semence aura un passage libre pour pénétrer dans la cavité, et pourra féconder une seconde fois. une courte digression anatomique fera connoître le vice de cette alléguation.

Neguer de Graaf est le premier, et peut-être le seul anatomiste qui ait donné une idée juste de la figure du canal, qui règne dans toute la longueur du col de la matrice. il ne le représente point comme un cylindre, mais dans toutes ses branches ce canal est comme



forme de deux cônes, qui se touchent par leur base, et dont une pointe se trouve à son extrémité, vient s'ouvrir du côté du vagin, et l'autre s'ouvre dans la cavité de la matrice; de manière que ce canal est plus large dans son milieu qu'à ses deux extrémités. tel est certainement la figure de ce canal dans les femmes qui n'ont point eu d'enfants, ou qui n'en ont eu que peu. mais après plusieurs accouchemens la forme n'est plus la même, et principalement si les sœurs suivies de près, son orifice extérieur, par les dilatations forcées qu'il a éprouvées, perd de son renfort, et reste béant, tandis que l'orifice interne qui ne s'en écarte qu'insensiblement pendant la grossesse, qui n'en a reçu que peu à peu à faire une cavité commune avec la matrice, se rétracte et se restitue entièrement après l'accouchement, comme le fait tout le viscéral; le canal alors n'est plus qu'un cône environ d'un pouce de longueur, dont la base est du côté du vagin, et la pointe vers la cavité de la matrice; c'est ce que j'ai nombre de fois observé et fait observer, sur des cadavres de femmes qui avoient eu plusieurs enfans, et il est très aisé de s'en assurer.

Si hors d'utérus de la grossesse l'orifice extérieur est béant, sans que pour cela le canal s'ouvre dans toute sa longueur, il me paraît plus que probable, qu'il en est de même après la conception. J'avois que je n'ai point d'expériences qui m'assurent que dans ce tems, il se ferme du côté ~~interne~~ de la matrice, mais outre qu'il est raisonnable de le croire, et que par là on résout une difficulté, on n'a point de preuves qu'il ne l'en fasse; prétendre donc que la semence peut pénétrer dans l'intérieur de la matrice pendant la grossesse, c'est à dire que son canal est perméable dans toute sa longueur, parce qu'il est béant à l'extérieur, c'est tirer une conséquence qui peut être fautive, et qui l'est probablement.

on dira encore d'après M. DeBouillon pour prouver que la superfétation est possible, que si l'orifice se ferme après l'impregnation, la semence peut pénétrer dans la matrice à travers le tissu de ce viscéral; mais M. DeBouillon n'a donné cette opinion que comme hypothétique, ou tout au plus comme probable; ainsi puis qu'il est au moins douteux que la semence puisse entrer dans la matrice à travers la substance, avant la conception, on n'est nullement autorisé à arguer d'après cette hypothèse.

Voilà à quoi se réduisent les raisons sur lesquelles on se fonde, en faveur de la superfétation; ces raisons comme on vient de le voir ont bien peu de poids, ainsi se retranche-t-on sur les faits. on en trouve un grand nombre dans les auteurs, qui semblent en être des preuves.

(a) il est très probable que dans ce tems de la copulation l'orifice de la matrice s'ouvre pour recevoir la liqueur séminale, et qu'elle y entre en effet par cette ouverture qui doit se fermer; mais on peut croire aussi que cette liqueur, surpasse la substance active et prolifique de cette liqueur, peut pénétrer à travers le tissu même des membranes de la matrice; car la liqueur séminale étant comme nous l'avons prouvé, que cette liqueur est composée de molécules organiques, qui sont en grand mouvement et qui sont en même tems d'une pénétration extrême, il est possible que ces molécules parties actives de la semence puissent à travers le tissu des membranes les plus serrées, et qu'elle y aient pénétré celle de la matrice avec une grande facilité. Hist. Nat. de M. DeBouillon. T. 2. p. 324. et 325.

généralités; ils le seroient à la vérité s'ils étoient bien avérés, et détaillés avec exactitude & précision, mais ce sont pour la plupart des récits vagues et des historiettes, et ^{presque aucun} n'est rapporté par un observateur sur lequel on puisse compter. celui de M. Parsons mérite le plus de considération; il dit qu'en 1714 une femme crut souffrir les approches d'un nègre, peu de temps après quelle eut reçu les caresses de son mari, accoucha de deux enfants, l'un blanc et l'autre noir; M. Plan a rapporté dans une de ses leçons en 1768 un exemple de renouveau à celui là, que si je n'étois aussi convaincu que j'en suis de la bonne foi, je croirois que son récit est calqué sur celui de M. Parsons; il a dit avoir accouché à Paris la femme d'un nègre, de deux enfants, l'un blanc et l'autre noir, et cette femme étoit vivement soupçonnée d'avoir des habitudes avec un autre que son mari.

Pour que ces deux faits fussent anés authentiques pour prouver la superfétation, il ne suffiroit pas qu'on en vît l'exactitude des circonstances qui du commencement de la grossesse de ces deux femmes, il faudroit encore, ce qui n'est pas possible, qu'on pût prouver que cette bizarre accouche n'eût pas été un fait de la nature; on a vu des femmes porter en même temps un enfant bien constitué et une masse informe; on les a vu dans les mémoires de l'Académie des Sciences qu'une femme accoucha de deux jumelles, dont l'une étoit vivante et bien formée, et l'autre n'avoit ni tête ni poitrine; on ne peut assurément pas attribuer à superfétation la production de ces deux monstres, on auroit, à ce que je pense, aussi peu de raison de lui imputer celle d'un enfant blanc et d'un noir; car quoique les apparences semblent militer en sa faveur, outre que dans l'ordre physique comme dans le moral on ne doit pas raisonnablement s'en fier aux apparences, qui peuvent des apparences spécieuses contre des raisons solides qui prouvent que la superfétation est impossible.

Le mécanisme de la grossesse ne paroit résister à cette addition d'un fœtus à un autre d'un conceptus quel que temps auparavant du instant que celui doit être le produit de la conception et se trouve dans la matrice, la cavité de ce viscère, qui étoit très étroite, en est remplie. Si ces substances n'y prennent pas adhérence immédiatement après qu'elles y sont déversées, d'où elles n'y restent elles que peu de temps isolées; au bout de ce court espace de temps, ce que M. Lamer appelle la portion la plus intérieure, c'est à dire ce qui doit devenir le placenta, prend racine dans une portion de l'étendue de la matrice; l'autre portion qui doit être le chorion contracte adhérence avec toute la partie de son intérieur. comment pourroit-on concevoir que la cavité de la matrice étant occupée par des substances qui lui sont attachées dans tous ses points, le spermatozoïde puisse y trouver place; quand même il l'y trouveroit; la progression s'en croit arrêtée, et son action bornée par la rencontre



de la portion de la première conception, qui seroit voisine de l'endroit par où il auroit entré; car par quelle voie cet esprit pourroit-il traverser et parvenir jusqu'à la trompe; pour offrir la fécondation; ou si on ne conviend pas qu'il soit nécessaire pour la fécondation que l'esprit seminal parvienne jusqu'à la trompe, ce qui cependant ne peut être raisonnablement contesté; comment celui qui descend de l'ovaire dans la matrice pourroit-il s'y introduire, et y être imprégné de cet esprit seminal? en quel endroit se fera cette imprégnation; en quel endroit le résultat se déclarera-t-il? et ne pourra-t-il être qu'au détachement d'une partie du premier oeuf qui avoit déjà contracté adhérence; que deviendra cette portion ainsi isolée; sera-t-elle flottante, ou prendra-t-elle adhérence avec celle du second oeuf qui se trouvera vis à vis d'elle. Je crois qu'il est impossible de résoudre toutes ces difficultés.

Si cependant il étoit vrai que le produit de la conception ne pris racine dans la matrice que quelque temps après qu'il y eût renfermé, et que la cavité du col ne fût pas exactement close par son extrémité interne, l'esprit seminal pourroit dans une copulation ultérieure parvenir jusqu'à la trompe sans offenser la première conception, et alors le premier oeuf seroit forcé de céder une partie de la place qu'il occupoit à un nouvel hôte; mais cette superfétation ne pourroit se faire que dans l'intervalle d'un temps qui s'écouleroit avant que la première conception eût pris racine, et cetemps est trop court pour qu'on puisse s'en apercevoir. outre cela il n'en est pas démontré que la conception reste même un instant isolée dans la matrice, il lui faut des écus pour qu'elle puisse germer et végéter, comment en recevrait-elle si elle ne communiquoit avec aucun vaisseau. J'adopterai volontiers à cet égard l'opinion de M. De Haller. Je ne nie pas, dit-il, que l'oeuf humain ne soit un petit espace de temps flottant dans la matrice, mais je suis porté à croire qu'on croira qu'il est quelque temps sans y contracter adhérence, parce que jusqu'à un certain temps, son adhérence est très légère.

On ne seroit pas fondé à conclure en faveur de la superfétation, parce qu'on remarque quelquefois deux lieux dans certains animaux comme le lièvre et le lapin; l'un ou l'autre d'une piece de plus contre la possibilité dans la femme; dans ces animaux la matrice est bicornue; la conception peut s'être faite dans une des cornes, tandis que l'autre sera vide; cette première naissance plus de communication avec la matrice, parce qu'on entre de ses racines, tout ce qui se passe dans l'intérieur de ce viscère lui est étranger; ainsi si l'animal s'accouple dans le cours de la gestation, la semence entrera dans la matrice avec autant de facilité que si les deux cornes étoient libres, et il pourra s'en faire une

nouvelle conception; autrement que la matrice d'une femme n'étant qu'une seule cavité, cette seconde
conception ne peut absolument avoir lieu. par la raison contraire une femme qui seroit construite
comme cette petite fille d'un an que M. l'abbé adinque; et comme M. Desdieu m'a bien eu voir
rencontré une dans des travaux anatomiques, est à dire qui avoit la matrice double, pourroit
porter à la fois dans son sein, des enfans conçus dans des lieux différens; mais cette conformation
singulière est très rare pour qu'on puisse lui attribuer tous les exemples que l'on cite d'enfans
jumeaux nés à de grands intervalles l'un de l'autre.

mais c'en trop m'étendre sur un point de physiologie, sur lequel je ne prétends pas convaincre de
ma opinion; se jette à quelques objets relatifs aux jumeaux qui sont utiles pour la pratique. il
seroit très important de résoudre s'il se présentent des signes qui décèlent deux enfans contenus
dans la matrice. ce n'est pas dans les cas ordinaires qu'on a intérêt d'en être instruit; mais outre que
des raisons d'intérêt ou de politique peuvent dans certaines circonstances faire désirer de le
sçavoir, il peut se rencontrer dans la pratique de chirurgie, des cas où il est de la dernière
conséquence de le reconnaître. une femme a eu plusieurs ~~enfants~~ accouchemens, dans lesquels, malgré
toute l'adresse et les ménagemens possibles, on n'a pas pu amener un enfant vivant ^{parce qu'on} ~~parce qu'on~~
~~de ces enfans~~ ^{étaient} ~~seuls~~ ^{cependant} le biberon n'est pas au si mal conformé, pour qu'un enfant
gros et flux ne puisse en franchir les détroits sans périr, mais s'il a le volume ordinaire d'un
~~seuls~~ ^{seuls} de neuf mois bien constitué et fort, il est prouvé par l'expérience qu'il perira au passage; le
seul moyen de lui sauver la vie est l'opération césarienne. cette femme d'ailleurs grosse et parvenue
jusqu'à son terme. s'il y a deux enfans, est moralement certain que séparément ils n'ont pas autant
de volume que rien auroit vuient, que conséquemment ils pourront sortir vivans, ce que l'opération
n'est point indiquée; autrement que s'il n'y en a qu'un les exemples précédens la rendent indispensable.
mais comment reconnaître qu'il y a deux enfans, y a-t-il des signes qui en avertissent.

Les signes de la grossesse dans les premiers tems sont si équivoques, qu'il est impossible d'en
faire raison de distinguer s'il y a plusieurs enfans; mais les anciens ont dit que dans les derniers mois
on pouvoit avoir des certitudes sur la présence de plusieurs enfans dans la matrice; quelque
modernes depuis peu ont révélé cette opinion qui étoit absolument tombée dans le discrédit; ils
n'en ont point établi d'autres signes que les anciens; chacun nous donne donc quels sont les marques
auxquelles ~~on peut reconnaître~~ ils croient qu'on peut en être assuré.

ils disent ~~que~~ que quand la grossesse est double, le volume du ventre est plus considérable; ce volume
du ventre n'estoient rien de positif. ¹⁰ ~~mais~~ il est tout simple que dans une première grossesse



on ne peut ^{en} juger par comparaison, ainsi il ne peut pas donner le moindre soupçon de grossesse double.
dans une grossesse subséquente, le ventre peut être plus gros, sans que pour cela il y ait deux
enfants; les muscles et les tégumens du bas ventre se sont accoutumés à s'étendre par l'extension qu'ils
ont éprouvée dans les précédentes grossesses, et ils s'étendent plus facilement; la matrice trouvant de
leur part moins de résistance, prend plus d'extension sur le devant, et conséquemment quoiqu'il
n'y ait qu'un enfant, le ventre devient plus gros.

Outre cela il y a des femmes qui portent leur grossesse tout en dedans et qui paraissent plus grosses
que si la tumeur étoit répartie dans toute la circonférence du bas ventre.
mais une raison plus forte, c'est que ce n'est ni le volume ni la pluralité des enfants qui donnent plus
d'extension à la matrice; ce ne sont point les substances solides qu'elle renferme qui par leur
augmentation d'union rendent le ventre la source de se dilater, ce ne sont que les eaux; c'est
donc la plus grande quantité de ces eaux qui lui donne plus d'étendue; ainsi si le volume du
ventre est plus gros, c'est qu'il y a une plus grande quantité d'eau dans la matrice; ceci est confirmé
par l'observation; car on voit des femmes dont le ventre étoit d'une grosseur prodigieuse donner
le jour à un enfant très-fluet, et rendre une grande quantité d'eau.
on dit encore que quand il y a deux jumeaux, les mouvemens se font sentir en même temps
dans deux endroits différens; mais un même enfant peut remuer en même temps les bras droit et
la jambe gauche, ou même les deux extrémités du même côté et faire éprouver à la mère en
même temps deux sensations très distinctes dans deux points fort éloignés; ce signe en total
est trop futile pour mériter la moindre attention.

2.^e il y a d'ordinaire un enfoncement plus ou moins marqué, qui règne depuis le nombril jusqu'au
pénit. 1.^o il est constant que cette ligne n'existe pas toujours dans les grossesses doubles, à quel
d'un autre côté on l'observe très-souvent, quoiqu'il n'y ait qu'un enfant contenu dans la
matrice? quand cette ligne se fait remarquer il est plus que probable que cet enfoncement
se borne aux tégumens sans que la matrice y participe, elle n'en est pas moins uniformément
dilatée dans toute son étendue; ce qui donne lieu à cet enfoncement, c'est que la ligne
blanche, ou quelque autre partie agglomérée n'est moins sujette à l'extension que le
reste des tégumens. 2.^o en faisant attention à la manière dont sont situés deux placentas
dans la matrice, on verra qu'il n'est pas possible qu'ils donnent lieu à cet enfoncement.
deux placentas ne peuvent être distans l'un de l'autre, s'ils ne sont pas toujours
adhérens, il est certain qu'ils s'entretoûchent toujours dans une grande étendue; dans cela

l'union des membranes qui forment la cloison qui sépare les fœtus, quand ils ne sont pas confondus, ne se feroit qu'à une certaine distance des placentas, et il y auroit un vuide comme on l'observe au médiastin; il n'est pas raisonnable de supposer ce vuide; il résulte aux loix du mécanisme de la grossesse. Si donc les placentas sont adhérens, ou du moins s'ils s'entrouvent, les eaux des deux enfans ne seront séparées que par la cloison, et les deux amnios qui la forment par leur adonement une très-petite épaisseur pour qu'il y ait entre ces eaux une distance sensible; il ne pourra donc pas y avoir la moindre dépression à l'endroit de la matrice où elles s'unissent.

D'ailleurs, est-il toujours du nombril au pubis qu'est tracée cette ligne de dépression; pour quelle fin produite par l'adonement des deux amnios, il faudroit que ce adonement se fit toujours parallèlement à cette ligne, ou ne peut raisonnablement avancer cette proposition, car il faudroit pour cela que dans toutes les grossesses doubles les deux placentas ouj, au cas, chacun exactement la moitié de la paroi antérieure ou postérieure de la matrice, et que ce vuide ne fût jamais oblique; est-ce que certainement personne n'osera avancer.

Enfin on dit que quand il y a plusieurs enfans les inconvénients de la grossesse sont plus marqués; dans les derniers mois; que les extrémités inférieures sont plus tuméfiées, que l'influre s'étend jusqu'aux lombes, qu'il s'y forme même un bourrelet sans apparent, que la femme marche avec plus de difficulté etc. L'expérience démontre que cet état ne prouve rien; on voit tous les jours des grossesses très-très pénibles sur la fin sans qu'il y ait plusieurs enfans; on voit des femmes qui n'ont éprouvé sur la fin de leurs précédentes grossesses aucune inconvénient; ou du moins qui n'en ont eu que de légers, et dans une autre très-avancée depuis les autres ont été jusqu'à ne pouvoir marcher, être constipées etc. quoiqu'elles n'aient eu qu'un enfant; et au contraire il y a beaucoup de femmes qui dans des grossesses précédentes d'un seul enfant, ont été en proie à nombre d'inconvénients, en sont bien moins dans une grossesse double; plusieurs observations de la Matto en font preuve.

Si tous ces signes sont si peu authentiques, à quel caractère peut-on reconnaître une grossesse double; sur quoi fondent certains gens merveilleux prétendent-ils qu'il y en a des signes sûrs, et vont-ils publier avec une certaine ostentation qu'ils ne s'y méprendront jamais; sans en avoir pas que quel que fois on ne puisse en avoir jusqu'à une centaine; si une femme par exemple a eu plusieurs grossesses doubles et plusieurs singles, et que les symptômes suggestifs en aient été différents et par la nature et par l'intensité; mais ces cas sont très-rare, et ne tiennent point à conséquence pour les autres; et j'ose avancer que dans une première grossesse double il est de toute impossibilité de prononcer quelle l'en effectivement.



Il y a loin de la certitude à la presumption; ainsi quoique j'aie dit qu'on ne peut en amour qu'une
seule grosse porte plusieurs enfans dans son sein je ne prétends pas qu'on ne puisse
quelquefois le soupçonner. la combinaison des signes que je viens d'articuler; des symptômes
différens de ceux des grossesses ordinaires; la manière dont on a eu des grossesses
doubles, en un mot mille particularités qui se présentent pour leur réunion faire
présumer qu'une femme est grosse de plusieurs enfans. il est de plus un moyen fort simple
qui pourroit quelquefois très souvent avoir quelque force: en palpant toute l'étendue du
bas ventre dans les derniers tems de la grossesse, il n'est pas toujours impossible de distinguer
avec précision, à travers les tégumens et la substance de la matrice, les parties de deux enfans.
on pourra surtout juger avec aisé de fausseté par la forme et la délicatesse de deux parties
rondes que l'on sent en même tems dans deux endroits distans l'un de l'autre, qu'il y a deux
fœtus. ce moyen ne réussit pas toujours, et n'est pas toujours capable de lever tout doute;
mais dans le cas supposé il tiendra du moins en suspens, jusqu'à ce qu'on l'ait aisé employé
pour s'en assurer s'il est possible; et dans une circonstance aussi grave et aussi délicate, l'en
ferme aura pour ne pas pratiquer légèrement une opération de la dernière importance, qui
pourroit être pas indispensable.

Une autre question qui intéresse la pratique des accouchemens, est de savoir si lorsque
l'accoucheur a reconnu qu'il y a des jumelles, il doit après la sortie du premier enfant, procurer
sans délai à l'extraction de l'autre, ou s'il est plus sage de commettre son expulsion à la nature,
et d'attendre un second travail. Si on consulte ses efforts les anciens auteurs de traités
d'accouchemens, on verra qu'ils conseillent tous d'abandonner à la nature le soin de
procurer la sortie du second enfant, il paroît même qu'ils se sont imaginés qu'il ne
pourroit y avoir à cet égard aucune difficulté. Mauriceau disoit plus encor, il pensoit que
dans ce cas il faut gêner les membranes du second, amener sa tête au passage, et le laisser
jusqu'à ce que de nouvelles douleurs l'expulsent de la matrice.

Nous devons au contraire beaucoup aux anciens; ils nous ont laissé nombre d'écrits
des quels on ne peut s'écarter sans tomber dans l'erreur; mais aussi on ne peut dis convenir
que depuis le commencement de ce siècle les connaissances qu'on a acquises dans la théorie
et dans la pratique de l'art des accouchemens, n'ont éclairé et enrichi cet art, et ne l'ont
pour ainsi dire fait entièrement changer de face. Tous habiles qu'étoient ces Mauriceau
leur autorité n'est pas d'un grand poids dans bien des cas, et on a corrigé des points de doctrine
erronés qu'ils nous ont transmis, non seulement depuis eux, mais même pendant qu'ils vivoient encore.

Douteurs même de Mauriceau la Motte avoit après par la propre expérience qu'il étoit beaucoup
 avantageux d'élever promptement le second accouchement quand il y a deux enfans qui se
 commettent à la nature l'expulsion du second. dans les commencemens de la pratique il suivoit les
 préceptes reçus alors, mais les effets qu'il en avoit éprouvés l'ont détaché de cette pratique. voici ce
 qu'il en dit après de si fâcheuses épreuves je n'y ai été et n'y serai repris de ma vie; et il ajoute
 dans un autre endroit « quand la femme est grosse de deux enfans, et que les premiers viennent natu-
 rement, si le second est bien détaché, que les douleurs de la mère suivent, que les eaux percent, et
 que l'enfant sort, c'est une nécessité de commettre un pareil accouchement au bénéfice de la
 nature; mais si au contraire la femme après être accouchée d'un premier enfant reste sans
 douleurs, que le second soit bien ou mal placé, et les eaux percent ou non, j'accouche incontinent
 la femme. »

A l'occasion de cette pratique de la Motte le traducteur de P. Hunter dit qu'il est constant que
 la Motte après le bon parti et après avoir dit que cet accouchement se comportoit comme les contempo-
 rains dans les commencemens de la pratique il ajoute: mais il faut remarquer que les douleurs
 efficaces se faisoient quelquefois attendre pendant longtems, et qu'elles devenoient même funestes
 à l'enfant il changea de méthode; voilà, dit-il, l'avantage qu'il y a de travailler avec réflexion.
 Smith est aussi positif sur ce point: « lorsque les membranes, dit-il, ne sont point rompues, que
 la tête ne suit point immédiatement, il faut retourner l'enfant tout de suite, et le délier pour
 les pieds, afin d'épargner à la femme les fatigues d'un second travail, qui pourroit être très long
 et quelquefois d'autant plus dangereux, qu'il l'affoiblit davantage. il a mis ce précepte en pratique
 car il rapporte dans son 3.^e volume plusieurs observations sur des accouchemens de jumeaux
 dans lesquels il a fait sans délai l'extraction du second enfant. »

C'étoit aussi le sentiment de Roederer, car en parlant des jumeaux il dit que s'il n'y a point
 d'épargne que les douleurs redoublent, il vaut mieux tirer l'enfant par les pieds que de différer
 l'accouchement; il ajoute à la vérité si la femme est faible, et cette restriction semble signifier que si
 elle ne l'est pas, il n'en faut néanmoins déterminer l'accouchement.

Quoique M. Leveau ne se soit point expliqué sur cet article dans son ouvrage, je crois qu'il
 pense qu'il ne faut point différer de tirer le second enfant, et qu'il en donne le précepte dans ses
 cours particuliers. M. Barbaeu le recommande aussi dans les leçons.

après des autorités si positives et si fortes, je pense qu'il ne doit rester aucun doute sur la conduite
 que doit tenir l'accoucheur dans le cas de jumeaux; cependant pour ne rien omettre de ce qui peut en
 convaincre, qu'il me soit permis d'ajouter quelques réflexions, et d'expliquer les motifs qui peuvent
 porter à quitter ce parti.



1^o quand le premier enfant est sorti, la tête du second ne vient pas tout d'un coup prendre la place
qu'il occupoit dans le bairin; il est au contraire très ordinaire que le second travail ne recommence
que fort longtemps après; la tête à vu les douleurs ne reviennent qu'à bon escient de vingt heures, et on a
même vu quelquefois s'écouler plusieurs jours, dans lesquels reviennent ou ne doit pas croire
qu'une femme fatiguée d'un premier travail, se repare, et reprend ses forces pendant ces
intervalles de temps; la pratique fait voir le contraire. outre que cette expectative inquiète une
femme, et que ^{long} son étude ~~de l'opération~~ ^{beaucoup de} produit ~~de~~ ^{de} l'ordre dans l'économie
animale, la femme languit pendant ce temps, elle s'affoiblit insensiblement, et ne peut aujour-
d'hui résister à un second travail.

Il est assez difficile d'expliquer pourquoi une femme qui ne souffre point, et qui n'a éprouvé
d'autre évacuation que celle d'un fluide qui lui est pour ainsi dire étranger, ou du moins qui ne lui
est d'aucune utilité, s'affoiblit et considérablement; cependant l'expérience le prouve. il n'en
point d'accoucheuse qui n'ait été témoin des funestes effets d'un trop long retardement; quand
par exemple la tête de l'enfant est ~~enterrée~~ ^{enfermée} en garage, ~~et~~ ^{et} qu'une sage femme peu
instruite qui n'a pas jugé le cas, ~~attend~~ ^{attend} des forces de la nature l'expulsion de l'enfant;
elle se croit même autorisée par la cessation subite et totale des douleurs; dans l'ignorance de le-
voir reviennent elle attend toujours et même plus. les assistants plus inquiets alors de l'affoiblissement
de la femme, que du peu de progrès du travail, font appeler un accoucheur; il arrive et termine
l'accouchement en fort peu de temps; mais souvent il ne fait qu'ajouter avoir pris que son
sejour est trop tardif, et après en avoir averti; car il est prouvé que certain que la femme ne
survive pas à l'opération, quoique par elle même exempte de danger, et il est douloureux de voir
que son pronostic n'était que trop fondé.

on voit souvent la même chose quand on enfante se présente en mauvaise situation, ce qui est
resté dans cet état pendant un certain temps, sans qu'il y ait de douleurs. Je fus appelé il y a
quelques années pour secourir une femme en travail. J'appris qu'il y avait quelques jours que les
eaux s'étoient écoulées, ce que depuis ce temps la femme n'avoit pas eu la moindre douleur. Je
reconnus que l'enfant pressait la face, et quoique la femme eût perdu de ses forces, elle
n'étoit pas assez affoiblie pour me faire craindre pour sa vie. Je dis à deux sages femmes qui
étoient présentes, et au mari, qu'il falloir promptement terminer cet accouchement; je me disposais
à retourner l'enfant; mais une parlotte s'y opposa; les fils sortirent le danger qu'elle faisoit
courir à la femme par ce délai, mais mes raisons eurent aucun effet si je fus contrainct de me
retirer. on me rappela le lendemain; je trouvai la femme dans forces, et pour ainsi dire sans vic-

quoique pendant cetems elle n'eût point eu de douleurs. Je tirai hautement les plus facheux
prognostic, et malgré cela pour me mettre à l'abri de tout reproche, je fis appeler M. Bermond.
il jugea ainsi que moi que ce événement ne pourroit avoir qu'un fin tragique, et le dit
ouvertement. nous terminâmes l'accouchement, et la femme mourut quelques heures après.

Ces exemples prouvent donc que quand le travail de l'enfantement a commencé, et qu'il est intérieur,
quoique les douleurs cessent totalement, la femme perd de ses forces, et court les plus grands risques,
il est donc simple que la vie de l'enfant n'en soit pas moins exposée, et je me crois obligé de m'étendre
sur ce point; cette seule raison doit donc engager à profiter du moment, et à terminer avec célérité
un second accouchement, quand un premier enfant en sort, soit naturellement, soit par le
secours de l'art, mais il y a encore d'autres raisons qui doivent y déterminer à le faire.

Il est hors de doute que la sortie d'un enfant est une prodigieuse épreuve de la matrice, le
vagin, à son entrée dans toute son étendue, et toute la vulve; il est certain aussi que dès qu'il est
sorti toutes ces parties, par leur élasticité et par leur tendance naturelle à se rapprocher, se resserrent,
et perdent cependant beaucoup de leur largeur. plus il y a d'etems que l'enfant en sort, et
plus ces parties se serrent et se rapprochent de leur état naturel; il résulte donc que si longtemps après
l'accouchement d'un premier enfant on est forcé d'introduire la main dans la matrice, parceque
le second sera dans une mauvaise situation, ou par quelque autre cause, on fera une distension
forte en ces parties, et on causera beaucoup plus de douleurs, à la mère que si on l'eût fait à
l'instant de la sortie du premier enfant.

Si donc immédiatement après que le premier est sorti, le second ne vient pas prendre sa place dans
le bassin, quelle précaution que le second s'y représente dans une situation naturelle; n'y a-t-il pas
au contraire plus d'agacement que de situation sera vicieuse, et qu'on sera par conséquent forcé
au bout de 6. ou 8. heures, après deux autres jours et même plus, de porter la main dans la
matrice, et de faire beaucoup souffrir la femme, tandis qu'on lui auroit épargné toutes ces
douleurs, si on eût agé à temps. cette raison seule, que cependant n'a pas aucune de force que
la première, me parait décisive.

Mais ceux qui croient à la superfétation pourrout objecter que le premier enfant peut être
terme sans que le second y soit, et que par conséquent le tiers de la matrice immédiatement
après que le tiers en est sorti, lui enlève un fruit qui n'est pas encore mûr, et être homicide
de cet enfant puis qu'il n'est pas viable, et qu'il le seroit devenu, si on lui eût laissé le tems de
prendre le degré d'accroissement et de force qui lui sont nécessaires.

Il est facile de répondre à cette objection. pour se conduire d'après ce principe, il ne suffit pas
qu'on ait quelque soupçon sur la possibilité de la superfétation, il faudroit qu'il fut démontré



qu'elle est effectivement ^{possible}, et même quelle a eu lieu dans le cas qui se présente; car personne
ne doute qu'en la matrice même, on ne soit forcé de convenir que les plus communément deux
fœtus sont conçus du même acte. Pourquoi donc dans le doute qu'en enfant qui est resté
dans la matrice, après l'écoulement d'un autre, est d'une conception postérieure à celle du premier,
l'enfant à perdre la vie, et la mère à s'affaiblir, à s'épuiser, et à mourir ainsi qu'elle, ou au moins
à souffrir de vives douleurs qu'on croiroit plutôt égarner; ce seroit faire un mal réel dans la
crainte d'un mal léger, qui est au moins incertain. D'ailleurs quand il seroit prouvé qu'une
conception ultérieure a pu avoir lieu, au moins que cette seconde conception n'a été faite fort
longtemps après l'autre, ce qui ne se conçoit pas, quel ris qu'il y auroit-il de faire l'contraction d'un enfant
qui ne seroit pas totalement parvenu à son terme; n'a-t-on pas mille exemples d'enfants nés
à sept et huit mois qui vivoient et se développoient avec une vigueur qu'on auroit pu attendre; mais je le
répète cette crainte est trop peu fondée de rien qu'une supposition.

Je n'ai pas prétendu, en proposant qu'il est plus sage d'extraire du second fœtus immédiatement
après la sortie du premier, prescrire des règles de conduite aux membres de cette compagnie qui se
s'appliquent spécialement à la pratique des accouchements. Loin de ~~l'extrême~~ prétendre de leur
donner des leçons, j'en ai voulu comme à beaucoup d'autres, leur faire gloire de recevoir
leurs conseils; mais il m'a paru, quoiqu'il en soit de la pratique, que si on se bornoit à copier des
accoucheurs, qu'il étoit nécessaire d'éclairer sur ce sujet les personnes qui n'ont pas fait une
étude particulière; j'en ai entrepris que pour être long quand de ceux qui sans doute auroient
pu le faire mieux que moi, la brièveté que mon travail s'en aigrirait à l'audience.

ce 29. 9. 1770